

RODZICU !!!

Dopalacze, podobnie jak narkotyki, mają działanie psychoaktywne, czyli mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej definicji i sami farmakolodzy mają trudności z jednoznacznym stwierdzeniem, czym są dopalacze. Jedni uważają je za rodzaj narkotyków, które tym tylko różnią się od tych „prawdziwych” narkotyków, że do niedawna były sprzedawane legalnie. Inni określają je jako substancje psychoaktywne, a jeszcze inni (sprzedawcy) mówią na nie „produkty kolekcjonerskie”.

Zatrucie dopalaczami - objawy

Wszystkie dopalacze stanowią zagrożenie życia, a lista niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać, jest bardzo długa. Właściwie nie ma narządu, którego nie mogą uszkodzić. Stopień ich szkodliwości jest oczywiście zróżnicowany i zależy od wielu czynników: rodzaju dopalacza, ilości zawartych w nim toksycznych substancji, wieku, wagi i stanu zdrowia osoby zażywającej, okoliczności, jakie towarzyszą zażywaniu dopalacza. Często spożywa się je wraz z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, co znacznie zwiększa ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu.

Do najmniej groźnych objawów zatrucia dopalaczami należą: bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, problemy z koncentracją, stany lękowe.

Do poważniejszych, stanowiących już zagrożenie życia: zawał serca, udar mózgu, stany agresji, które mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub zabójstwa, śpiączka, niewydolność nerek, wątroby.

Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które cierpią na schorzenia przewlekłe: np. alergików, cukrzyków, dla osób z osłabionym układem odpornościowym i dla tych wszystkich, którzy znajdują się jeszcze w okresie rozwojowym, a więc dla dzieci i młodzieży. **Wśród objawów, które mogą świadczyć o zażyciu dopalaczy, można wymienić ponadto:** nadmierną potliwość, oczopląs, szczykościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe, stany lękowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, rozrywający ból głowy, migotanie przedsionków.

RODZICU !!!

Jeśli zdarzyło się, że Twoje Dziecko zażyło dopalacz i źle się czuje, pamiętaj, aby: wypilo dużo wody mineralnej, zachowało przy sobie opakowanie od dopalacza, aby pokazać lekarzowi, co ułatwi mu podjęcie akcji ratowniczej, nie siadać za kierownicą, nie zażywać żadnych leków, które mogą wejść w interakcje z substancjami zawartymi w dopalaczu a przede wszystkim – natychmiast poszukać lekarza.

Tu liczy się każda sekunda !!!

JEŚLI W OTOCZENIU DZIECKA ZAOBSERWOWAŁEŚ:

- ciężki, zapach w pokoju,
- fifki,
- bibułki i urządzenia do robienia skrętów,
- dziwny zapach ubrań,
- pudełeczka, słoiki z nieznanymi substancjami,
- miarki, łyżeczki z przebarwieniami.

W WYGLĄDZIE ZEWNĘTRZNYM:

- zmienioną bladą i ziemistą cerę,
- owrzodzenia w okolicach nosa,
- spadek wagi,
- zaniedbanie higieny,
- przekrwione oczy, rozszerzone lub zwężone źrenice.

W ZACHOWANIU:

- duże wahania nastrojów,
- nagłą zmianę nawyków,
- izolowanie się od bliskich,
- napady złości lub agresji,
- napady euforii lub obniżonego nastroju,
- problemy finansowe,
- wynoszenie przedmiotów z domu,
- bełkotliwą mowę,
- brak zainteresowania ulubionymi zajęciami.

WYSTĄPIŁY OBJAWY CHOROBY:

- omdlenia,
- osłabienia,
- nagłe pogorszenie stanu uzębienia,
- skoki temperatury,
- nagłe zmiany ciśnienia,
- wymioty,
- bóle ciała,
- wysięk nosa.

ZAINTERESUJ SIĘ !!!

TWOJE DZIECKO MOŻE BYĆ UZALEŻNIONE OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.